

# 코로나 바이러스와 결핵


LA 카운티는 코로나 바이러스 (또는 COVID-19) 펜데믹 상황 중에도 호흡기 질환 중에 하나인 결핵 (TB)의 예방과 치료에 총력을 기울이고 있습니다.

## 코로나19는 무엇입니까?

- 코로나19는 사람에서 사람으로 감염 될수 있는 바이러스로인해 급성 호흡기 질환을 유발합니다.

## 결핵이란 무엇입니까?

- 결핵은 일반적으로 사람의 폐를 공격하지만 신체의 다른 부분에도 영향을 줄 수 있는 심각하고 때로는 치명적인 질병(박테리아에 의한)입니다.
- 결핵에는 잠복성 결핵 감염과 활동성 결핵 질환의 두 가지 유형이 있습니다.
  - 잠복성 결핵 감염이있는 경우 다른 사람에게 전염 될 수 없습니다.
  - 치료하지 않으면 잠복성 결핵이 결국 활동성 결핵으로 발전하여 다른 사람들에게 전염 될 수 있습니다.



### 추가 코로나19 증상

- 노출 후 2-14 일 후에 증상이 나타날 수 있습니다
- 다른 증상들:
  - 미각이나 후각의 상실
  - 인후염과 충혈/코막힘
  - 메스꺼움/구토
  - 근육통/전신통증
  - 설사

### 비슷한 증상

- 코로나19 및 활동성 결핵 모두 다음의 증상을 유발할 수 있습니다
  - 기침, 호흡 곤란, 발열, 오한
- 감염된 사람이 재채기나 기침을 할 때 퍼집니다

### 추가 결핵 질병 증상

- 잠복성 결핵 감염을 치료하지 않으면 몇 주에서 몇 년 후에 활동성 결핵으로 발전될수 있습니다.
- 다른 증상들:
  - 수면중에 식은땀과 지속적인 흉부 통증
  - 피나 가래를 토하는 기침
  - 체중 감소 또는 만성 피로

## 결핵 위험이 높은 사람은 누구입니까?

- 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 또는 서유럽 / 북유럽 이외의 다른 국가에 거주 / 방문한 사람
- 면역 체계가 약화 된 사람 (예: HIV, 장기이식, 암환자 등)
- 결핵 질환이 있는 사람과 밀접한 접촉이 있는 사람
- 노숙자 / 교도소 생활을 한 적이 있는 사람

## 당신과 당신의 가족을 보호하는 방법

- 위험이 높은 경우 자신의 상태를 알고 잠복성 또는 활동성 결핵이있는 경우 치료를받는 것이 매우 중요합니다.
  - 결핵에 걸린 동안 COVID-19로 아프면 더 심각한 합병증을 유발할 수 있습니다.
    - 의사나 간호사의 지시에 따라 결핵 치료를 빨리 받으십시오.
- 사회적 거리를 두시고 마스크로 얼굴을 가리십시오.
- 손을 자주 씻고 표면을 소독하십시오.
- 씻지 않은 손으로 얼굴을 만지지 마십시오.
- 위에 언급 된 증상이 있으면 바로 담당 의사에게 연락하십시오.

## 테스트 / 추가 정보를 얻을 수있는 곳

- COVID-19 테스트: 전화 211 또는 방문 <https://lacovidprod.service-now.com/rrs>
  - COVID-19에 대한 추가 정보: <http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/>
- TB 테스트: Visit <http://ph.lacounty.gov/tb/docs/TBClinics2017.pdf>
  - TB에 대한 추가 정보: <http://ph.lacounty.gov/tb/factsheets.htm>