

LTBI

Side effects from medications to prevent TB are RARE, but watch for the following symptoms.



Los efectos secundarios de los medicamentos preventivos para la tuberculosis son poco comunes, pero esté atento a los siguientes síntomas.

Tác dụng phụ của thuốc ngừa lao là HIẾM, nhưng hãy để ý các triệu chứng sau đây.



Nausea or vomiting

Náuseas o vómitos

Buồn nôn hoặc ói mửa



Pain in your
abdomen

Dolor abdominal

Đau bụng



Poor appetite

Perdida de apetito

Ăn mất ngon



Yellow skin or eyes

Ojos ó piel amarillentos

Da hoặc mắt bị vàng



Dark urine (tea or coffee color)

Orina obscura (color té o café)


Nước tiểu đổi màu đậm (màu trà nâu hoặc màu cà phê)



Diarrhea

Diarrea

Tiêu chảy




A. Cotter

Skin rash or itching

Sarpullido o picazón en
la piel


Nổi mề đay hay ngứa
ngáy



Bruising and bleeding

Moretones y sangrado

Bầm tím và chảy máu





A. Cotter

Feeling tired

Sentirse cansado ó
fatigado


Mệt mỏi



Headache

Dolor de cabeza

Đau đầu



Numb or tingling hands or feet

Entumecimiento ó hormigueo en las manos y los pies

Tê hay cảm giác như kiến bò ở bàn tay hoặc chân

FOR PATIENTS ON 3HP



Flu-like symptoms

Síntomas similares a la gripe

Các triệu chứng giống như cúm



STOP taking the medicine and
IMMEDIATELY call the clinic!

¡PARE de tomar la medicina y llame
INMEDIATAMENTE a la clínica!

Ngừng uống thuốc và gọi điện
thoại đến sở y tế **NGAY LẬP
TỨC !**