



Side effects to TB medications are RARE, but watch for the following symptoms.

结核病药物鲜少出现副作用，
但请留意以下症状。

肺結核（tuberculosis, TB）
藥物的副作用很罕見，但要注意
以下症狀。



Nausea or vomiting

惡心或嘔吐

噁心或嘔吐



Pain in your abdomen

腹部疼痛

腹痛



Poor appetite

食欲不振

食慾不振



Yellow skin or eyes

皮肤或眼部发黄

皮膚或眼睛發黃



Dark urine (tea or coffee color)

尿液颜色较深（茶色或咖啡色）


尿色暗（茶色或咖啡色）



Diarrhea

腹瀉

腹瀉




A. Cotter

Skin rash or itching


皮疹或瘙癢

皮疹或皮膚瘙癢



Bruising and bleeding

瘀伤及出血



青腫和出血



A. Cotter

Feeling tired

感到疲倦


感覺疲勞



Headache

头痛

頭痛





Numb or tingling hands or feet

手足麻木或刺痛



手腳麻木或刺痛



Changes in vision

视力变化

視力變化




STOP taking the medicine and
IMMEDIATELY call the clinic!

停止服药，并
立即致电诊所！

停止用藥並
立即致電診所！

FOR PATIENTS WITH MDR, XDR TB



Palpitations, chest pain, dizziness

心悸、胸痛、头晕无力

心悸、胸痛、眩暈

FOR PATIENTS WITH MDR, XDR TB



Changes in hearing



听力变化



聽力變化

A. Cotter



STOP taking the medicine and
IMMEDIATELY call the clinic!

停止服药，并
立即致电诊所！

停止用藥並
立即致電診所！