



Side effects to TB medications are RARE, but watch for the following symptoms.

Los efectos secundarios de los medicamentos para la tuberculosis son poco comunes, pero esté atento a los siguientes síntomas.

Tác dụng phụ của thuốc điều trị lao rất HIẾM, nhưng hãy để ý các triệu chứng sau đây.



Nausea or vomiting

Náuseas o vómitos

Buồn nôn hoặc ói mửa



Pain in your  
abdomen

Dolor abdominal

Đau bụng



Poor appetite

Perdida de apetito

Ăn mất ngon



Yellow skin or eyes

Ojos ó piel amarillentos

Da hoặc mắt bị vàng



Dark urine (tea or coffee color)

Orina obscura (color té o café)


Nước tiểu đổi màu đậm (màu trà nâu hoặc màu cà phê)



Diarrhea

Diarrea

Tiêu chảy




A. Cotter

Skin rash or itching

Sarpullido o picazón en  
la piel

Nổi mề đay hay ngứa  
ngáy






Bruising and bleeding

Moretones y sangrado

Bầm tím và chảy máu





A. Cotter

Feeling tired

Sentirse cansado ó  
fatigado


Mệt mỏi



Headache

Dolor de cabeza



Đau đầu



Numb or tingling hands or feet

Entumecimiento ó hormigueo en las manos y los pies

Tê hay cảm giác như kiến bò ở bàn tay hoặc chân



Changes in vision

Cambios en la visión

Thay đổi tầm nhìn




STOP taking the medicine and  
IMMEDIATELY call the clinic!

¡PARE de tomar la medicina y  
llame  
INMEDIATAMENTE a la clínica!

Ngừng uống thuốc và NGAY  
LẬP TỨC gọi điện thoại đến  
sở y tế.

# FOR PATIENTS WITH MDR, XDR TB




Palpitations, chest pain, dizziness

Palpitaciones, dolor de pecho ó  
mareos

Tim đập mạnh, đau ngực, chóng  
mặt

# FOR PATIENTS WITH MDR, XDR TB



Changes in hearing

Cambios al oír (escuchar)

Những thay đổi về thính giác

A. Cotter





STOP taking the medicine and  
IMMEDIATELY call the clinic!

¡PARE de tomar la medicina y  
llame  
INMEDIATAMENTE a la clínica!

Ngừng uống thuốc và NGAY  
LẬP TỨC gọi điện thoại đến  
sở y tế.